

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Sagsbeh.: DEPTFE

Sags nr.: 1401722


Dok. Nr.: 1439102

Dato: 23. april 2014

Eksempel på RADS' indvirkning på lægemiddelanvendelsen


For at kaste lys over den indvirkning, RADS har på lægemiddelanvendelsen, kan der ses på monitoreringsrapporter fra før og efter implementeringen af behandlingsvejledninger fra RADS. Som et eksempel herpå henvises til nedenstående figur fra den 1. monitoreringsrapport for terapiområdet Hepatitis (2. kvartal 2011), hvor forbruget af lægemidlet Rebetol pr. region udgjorde henholdsvis 83, 0, 58, 3 og 100 pct. af det samlede lægemiddelforbrug på terapiområdet.

Før RADS-vejledning (2. kvartal 2011):



De tilsvarende tal er for 2. kvartal 2012 opgjort til henholdsvis 92, 100, 97, 92 og 100 pct.

Efter RADS-vejledning (2. kvartal 2012):



RADS' behandlingsvejledninger er således med til at ensarte lægemiddelanvendelsen på tværs af regionerne og dermed højne kvaliteten af behandlingen.